

Información y preparación para

**LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:**

**Anticoagulante Lúpico, Antígeno Von Willebrand, Antitrombina III, Factor de Coagulación II, Factor de Coagulación IX, Factor de Coagulación V, Factor de Coagulación VII, Factor de Coagulación VIII, Factor de Coagulación X, Factor de Coagulación XI, Factor de Coagulación XII, Factor de Coagulación XIII, Resistencia Proteína C Activada (RPCA).**

**INDICACIONES:**

- 4 horas de ayuno de lácteos y grasas.
- No suspenda la medicación, en ningún caso, sin consultar a su médico.
- Podrá realizarse el estudio si se encuentra en tratamiento con anticoagulantes orales (Sintrón, Azecar, Coumadin).

**Se recomienda no realizar el estudio si:**

- Se encuentra en tratamiento con Heparina de Bajo Peso Molecular (Clexane, Enoxaperin, etc.)
- Se encuentra en tratamiento con antitrombóticos orales o antifactor Xa (Pradaxa, Xarelto o Eliquis).

PREPARACIÓN

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

Para garantizar la calidad de sus resultados tenga en cuenta que: El ayuno consiste en no ingerir alimentos. Puede beber agua en cantidades habituales. No fumar, ni mascar chicle una hora antes de la extracción. Es importante que informe al técnico si se encuentra bajo un tratamiento y/o recibe medicación. Recuerde que es obligatorio presentar el documento de identidad y credencial de su cobertura médica si corresponde. Se recomienda realizar los análisis de laboratorio antes de los estudios de imágenes con contraste. De no ser posible, esperar al menos 24 horas.