

Información y preparación para

**LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:**

**Antígeno Prostático Específico (PSA), Antígeno Prostático Libre (PSA Libre), Relación PSA Libre/PSA Total.**

**INDICACIONES:**

Concurra al laboratorio con 8 horas de ayuno.

Detalle al técnico si está bajo algún tratamiento. Por favor, no subestime ningún medicamento. Algunas situaciones pueden alterar los niveles de PSA, por lo tanto, salvo indicación de su médico:

- No realice actividad física durante el día anterior a la extracción (especialmente andar en bicicleta/ciclismo y equitación).
- No beba alcohol la noche anterior a la extracción.
- Mantenga abstinencia sexual 48 horas antes de la extracción.
- Luego de una exploración rectal/prostática, espere 7 días para realizar el análisis.
- Luego de una biopsia rectal, espere 2 semanas para realizar el análisis.
- Luego de una resección uretral, espere 3 semanas para realizar el análisis.
- En caso de presentar infección urinaria, prostatitis, o fiebre, espere a que resuelva el cuadro para realizar el análisis.
- En caso de tomar algún suplemento o complemento vitamínico/dietario (cualquiera sea), por favor, de aviso al técnico.

PREPARACIÓN

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

Para garantizar la calidad de sus resultados tenga en cuenta que: El ayuno consiste en no ingerir alimentos. Puede beber agua en cantidades habituales. No fumar, ni mascar chicle una hora antes de la extracción. Es importante que informe al técnico si se encuentra bajo un tratamiento y/o recibe medicación. Recuerde que es obligatorio presentar el documento de identidad y credencial de su cobertura médica si corresponde.