

Información y preparación para
PUNCIÓN POR SONDA (Urocultivo)

INDICACIONES:

- La toma de muestra debe realizarla personal capacitado y con métodos asépticos, a fin de evitar el ingreso de microorganismos en la vejiga.
- Preferentemente no ingiera antibióticos 48 horas antes de la recolección de la muestra (salvo prescripción médica).

La toma de muestra varía en función del tiempo en que haya estado colocada la sonda vesical:

- Con sonda vesical recién colocada (recambio de sonda o cateterismo vesical intermitente), efectúe el goteo directo a través de la sonda: deseche los primeros 10-15 ml de orina y recoja el flujo siguiente.
- Con sonda vesical con menos de 7 días de colocada (cateterismo vesical permanente), debe efectuarse una punción proximal de la sonda: obture la sonda por medio de una pinza a unos 10cm de su inserción en el meato urinario y permita que se llene el extremo proximal durante 15 minutos. Desinfecte, con etanol al 70%, la porción proximal de la sonda donde se realizará la punción. Puncie con jeringa y aguja estériles y recoja asépticamente 15 ml de orina.
- En caso de sonda vesical con más de 7 días de colocada, deberá recambiar la sonda y proceder según las indicaciones provistas para sonda vesical recién colocada.
- La orina debe recolectarse, siempre, en un frasco estéril de boca ancha. No se aceptarán muestras provenientes de bolsas colectoras.

PREPARACIÓN